

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek za matematiko in računalništvo

dr. Marko Jakovac, dr. Niko Tratnik

Zbrano gradivo: vaje iz elementarnih funkcij

Maribor, 2019

PREDGOVOR

V tem gradivu so zbrane naloge, ki so primerne za ponavljanje in nadgradnjo srednješolskega znanja iz elementarnih funkcij ter so predvsem namenjene študentom prvega letnika matematike. Dodane so tudi naloge, ki obravnavajo osnovne ideje o realnih številih, limitah, zveznosti in odvodih. Zbirka je nastala v sklopu priprav na vaje pri predmetu Elementarne funkcije. Pri izbiri nalog sva si pomagala z različnimi učbeniki, zbirkami nalog, drugimi internetnimi viri ter nalogami dr. Mateje Grašič in dr. Matevža Črepnjaka, tako da zbrane naloge večinoma niso originalni prispevki.

Kazalo

1 Logika in množice	1
2 Funkcije	4
3 Realna števila	7
4 Stožnice	9
5 Linearna in kvadratna funkcija, absolutna vrednost	11
6 Potenčne in korenske funkcije	14
7 Polinomi	17
8 Racionalne funkcije	19
9 Limita in zveznost funkcije	21
10 Odvod	23
11 Kotne in krožne funkcije	25
12 Eksponentna in logaritemska funkcija	29

Poglavlje 1

Logika in množice

1. Naj bodo A, B, C, D izjave. Za vsako izmed naslednjih izjav preveri, ali je tautologija:

- (a) $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$,
- (b) $A \wedge A \Leftrightarrow A$,
- (c) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ (kontrapozicija implikacije),
- (č) $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B)$ (negacija implikacije),
- (d) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$,
- (e) $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$ (negacija disjunkcije),
- (f) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$ (negacija konjunkcije),
- (g) $(A \wedge (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$ (distributivnost),
- (h) $(A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$ (distributivnost).

2. Dana je izjava: *Če kobilice napadejo Maribor, postanejo vsi Mariborčani lačni.* Ugotovi, v katerih primerih je dana izjava resnična ozziroma neresnična.

3. Tone je izjavil: *Če mi bo oče posodil avto, bom prišel pod okno in vrgel kamen.*

- (a) Dano izjavo zapiši s simboli.
- (b) Tone se je zlagal. Kaj se je v resnici zgodilo?

4. Dane so naslednje izjave:

A : če je nekaj slepo, potem je to človeška ribica,

B : če je nekaj človeška ribica, potem je to slepo,

C : če nekaj ni slepo, potem to ni človeška ribica,

D : če nekaj ni človeška ribica, potem to ni slepo,

X : vse človeške ribice so slepe.

Ugotovi, katera izmed izjav A, B, C in D je ekvivalentna izjavi X .

5. Dane so naslednje izjave:

A : noben avto ni BMW,

B : niso vsi avti BMW,

C : vsaj en avto ni BMW,

D : vsaj en avto je Mercedes,

X : $\neg(\text{vsi avti so BMW})$.

Ugotovi, katera izmed izjav A, B, C in D je ekvivalentna izjavi X .

6. Naj bodo p, q in r izjave. Ugotovi, katera od spodnjih izjav je resnična in katera ne. Resnično dokaži, neresnično spremeni do izjave, ki bo resnična, in jo prav tako dokaži.

(a) Če je izjava p neresnična, je izjava $\neg(p \wedge q)$ resnična.

(b) Če sta izjavi p in r resnični, je izjava $(p \Leftrightarrow q \wedge r)$ resnična.

7. Skiciraj podane množice in določi relacije med njimi:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| > 4\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 \geq 8\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 < 0\}.$$

8. Skiciraj množico

$$A = (\mathbb{Z} \times [-1, 1]) \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

9. Skiciraj množico

$$A = (\{-1, 1\} \times (-1, 1)) \cup ((-1, 1) \times \{-1, 1\}).$$

10. Skiciraj podane množice in določi relacije med njimi:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\},$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x|, |y|\} \leq 1\},$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

11. Podane so množice $U = \mathbb{R}^2$, $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 2y \leq 0\}$, $B = \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\} \times \mathbb{R}$ in $C = (-1, 1) \times (-1, 1)$. Skiciraj množice A, B in C ter zapiši množice $A \cap B, B \cap C, U \setminus A$.
12. V ravnini je podan pravokotnik z oglišči $A(-1, -2), B(3, y_2), C(x_3, 2)$ in $D(x_4, y_4)$. Stranica AB je vzporedna z osjo x .
- Zapiši neznane koordinate in nariši pravokotnik.
 - Zapiši pogoj za točke na nosilkah stranic AB in CD .
13. V ravnini je dan pozitivno orientiran kvadrat z dolžino stranice 4 enote in ogliščem $A(-3, -1)$. Stranica AB naj bo vzporedna osi x .
- Nariši kvadrat in določi koordinate oglišč.
 - Izračunaj dolžino diagonale.
 - Nariši diagonali in določi koordinati presečišča diagonal.

Poglavlje 2

Funkcije

1. Naj bo f funkcija, ki vsakemu človeku priredi njegov mesec rojstva. Za funkcijo f zapiši definicijsko območje, primer zaloge vrednosti ter preveri, ali je injektivna oziroma surjektivna.
2. Naj bo f funkcija, ki vsakemu državljanu priredi njegov EMŠO. Za funkcijo f zapiši definicijsko območje, primer zaloge vrednosti ter preveri, ali je injektivna oziroma surjektivna.
3. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je podana s predpisom $f(x) = x^2$. Ali je f injektivna oziroma surjektivna? Če ni, ustrezzo spremeni domeno in kodomeno, da bo bijektivna.
4. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je podana s predpisom $f(x) = \cos x$. Ali je f injektivna oziroma surjektivna? Če ni, ustrezzo spremeni domeno in kodomeno, da bo bijektivna.
5. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je podana s predpisom $f(x) = x^5 + 2x^4 - x^3 - 2x^2$. Ali je f injektivna oziroma surjektivna? Če ni, ustrezzo spremeni domeno in kodomeno, da bo bijektivna.
6. Naj bo $A = [1, 3]$ in $B = [2, 5]$. Poišči vsaj eno bijekcijo $f : A \rightarrow B$ in dokaži, da je res bijekcija.
7. Naj bo $A = (0, 1)$ in $B = \mathbb{R}$. Poišči vsaj tri različne bijekcije $f : A \rightarrow B$.
8. Določi podmnožici realnih števil A in B tako, da bo funkcija $f : A \rightarrow B$, podana s predpisom $f(x) = \frac{x-1}{3-x}$, bijektivna. Zapiši tudi predpis inverzne funkcije f^{-1} .

9. Funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ je podana s predpisom

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \text{ je sod} \\ 3n + 1, & n \text{ je lih.} \end{cases}$$

Ali je funkcija f injektivna oziroma surjektivna?

10. Naj bo funkcija $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ podana s predpisom

$$f(x) = \begin{cases} x^2; & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \sqrt{2}x; & x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Ugotovi, ali je f injektivna oziroma surjektivna.

11. Podana je funkcija $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}_0$ s predpisom $f(a) = \sqrt{(a-1)^2}$.

- (a) Skiciraj graf funkcije f .
- (b) Ugotovi, ali je funkcija f injektivna ali surjektivna.
- (c) Če f ni bijektivna, ustrezno spremeni domeno, da bo.

12. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ naj bo podana s predpisom $f(x) = -x^2 + 1$. Določi $f([0, \infty))$, $f^{-1}((1, 3])$ in $f^{-1}((-2, -1))$.

13. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ naj bo podana s predpisom $f(x) = \cos x$. Določi $f^{-1}([\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}])$.

14. Naj bo $A = (0, 1) \times \mathbb{Z}$. Funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ naj bo podana s predpisom $f(x, k) = x + k$.

- (a) Določi $f(A)$, $f^{-1}(\{0\})$, $f^{-1}(\mathbb{Z})$ in $f^{-1}((\frac{1}{2}, \frac{3}{2}))$.
- (b) Dokaži, da je f injektivna.

15. Naj bo $A = \{f \mid f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ funkcija}\}$. Podana je preslikava $F : A \rightarrow \mathbb{R}$, $F : f \mapsto f(0)$.

- (a) Ugotovi, ali je F injektivna oz. surjektivna. Svoje trditve dokaži ali s protiprimerom ovrži.
- (b) Ali je funkcija F , zožena na množico $B = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 2x + b, b \in \mathbb{R}\}$ injektivna oz. surjektivna? Odgovor utemelji.

16. Naj bo $F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ funkcija s predpisom $F(n, m) = n - m$.

- (a) Ugotovi, ali je F injektivna oz. surjektivna.
- (b) Določi množico $F^{-1}(\{-2, 2\})$ in jo skiciraj v \mathbb{R}^2 .
17. Naj bosta $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ podani s predpisoma $f(x) = 2^x$ in $g(x) = x - 1$. Določi predpisa funkcij $f \circ g$ in $g \circ f$. Ali sta ti dve funkciji bijektivni? Če sta, to tudi dokazi.
18. Podani sta funkciji $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisoma
- $$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ 0, & x \geq 0 \end{cases} \text{ in } g(x) = \begin{cases} 1, & |x| \geq \frac{\pi}{2} \\ |\sin x|, & |x| < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$
- Zapiši predpisa funkcij $f \circ g$ in $g \circ f$ ter nariši grafe vseh štirih funkcij.
19. Podani sta funkciji $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisoma
- $$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x \leq 0 \\ 1 - x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \text{ in } g(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq 0 \\ 3 - 2x, & 0 < x < 1 \\ 3x, & x \geq 1. \end{cases}$$
- Zapiši predpisa funkcij $f \circ g$ in $g \circ f$.
20. Naj bosta $f : A \rightarrow B$ in $g : B \rightarrow C$ funkciji. Dokaži: če sta funkciji f in g injektivni, potem je $g \circ f$ injektivna.
21. Naj bosta $f : A \rightarrow B$ in $g : B \rightarrow C$ funkciji. Dokaži: če sta funkciji f in g surjektivni, potem je $g \circ f$ surjektivna.
22. Naj bosta $f : A \rightarrow B$ in $g : B \rightarrow C$ funkciji. Dokaži: če je funkcija $g \circ f$ injektivna in f surjektivna, potem je g injektivna.

Poglavlje 3

Realna števila

1. Naj bo p praštevilo. Dokaži, da je \sqrt{p} iracionalno število.
2. Dokaži, da je število $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ iracionalno.
3. Dokaži, da je število $\log_2 3$ iracionalno.
4. Naj bo $n \in \mathbb{N}$. Dokaži, da je število \sqrt{n} bodisi naravno bodisi iracionalno.
5. Naj bo q neničelno racionalno število, x in y pa naj bosta iracionalni števili in naj velja $x > 0$.
 - (a) Dokaži, da so števila \sqrt{x} , $q + x$ in qx iracionalna.
 - (b) Ali lahko kaj podobnega poveš o številih $x + y$, xy in \sqrt{q} ?
6. Določi supremum, infimum, minimum in maksimum naslednjih množic, če obstajajo:
 - (a) $A = \{1 + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$,
 - (b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 < 5\} \subseteq \mathbb{R}$,
 - (c) $C = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 5\} \subseteq \mathbb{R}$,
 - (d) $D = \{\frac{2n-3}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$,
 - (e) $E = \{\frac{2}{1+x^2} - 1 \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}$,
 - (f) $F = \{x \in [0, 1] \mid x \text{ ima v decimalnem zapisu vsaj dve trojki}\} \subseteq \mathbb{R}$,
 - (g) $G = \{x^2 - 6x \mid x > 0\} \subseteq \mathbb{R}$,
 - (h) $H = \{x^2 + x \mid x \in (-1, 1)\}$,

$$(i) \quad I = \left\{ \frac{m-2m^2}{m^2+4} \mid m \in \mathbb{N} \right\}.$$

7. Podana je funkcija f s predpisom

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x, & x \leq 0. \end{cases}$$

- (a) Skiciraj graf funkcije f .
- (b) Ugotovi, ali je f injektivna oziroma surjektivna.
- (c) Določi minimume, maksimume, supemume in infimume (če obstajajo) množic Z_f , $f((-1, 1))$, $f([-1, 0))$, $f((-\infty, 0])$, $f([0, 1])$, $f^{-1}((-1, 1))$.

Poglavlje 4

Stožnice

1. Podani sta množici $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 4x + y^2 \leq 5\}$ in $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 4x + y^2 = 5\}$.
 - (a) Skiciraj A in B ter ugotovi, ali množica B predstavlja graf kake realne funkcije realne spremenljivke.
 - (b) Določi množici X in Y tako, da bo del množice B predstavljal graf neke bijektivne funkcije $f : X \rightarrow Y$.
 - (c) Poišči inverz funkcije f ter skiciraj grafa funkcij f in f^{-1} .
2. Določi parameter m tako, da bo točka $T(-1, 5)$ ležala na krožnici $(x - 2m)^2 + (y - m)^2 = 25$.
3. Pokaži, da enačba $x^2 + ax + y^2 + by + c = 0$ podaja krožnico le, če velja $a^2 + b^2 - 4c > 0$.
4. Določi enačbo krožnice, očrtane trikotniku, ki ga določajo premice $x + y - 3 = 0$, $5x + 4y - 16 = 0$ in $3x + 2y - 8 = 0$.
5. Izpelji enačbo elipse v središčni legi.
6. Zapiši enačbo elipse v središčni legi in veliko osjo na abscisi, če merita razdalji enega gorišča od obeh krajišč velike osi 9 enot in 3 enote.
7. Izračunaj ploščino pravokotnika, katerega oglišča so presečišča elipse $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ in kroga $x^2 + y^2 = 52$.
8. Razišči medsebojno lego premice $x - 2y - 10 = 0$ in elipse $5x^2 + 2y^2 = 8$.

9. Izpelji enačbo hiperbole v središčni legi.
10. Elipsa $3x^2 + 5y^2 = 120$ in enakoosna hiperbola imata skupni gorišči. Določi enačbo hiperbole.
11. V enačbi $16x^2 - 9y^2 - 32x + 36y + a = 0$ določi a tako, da enačba ne bo predstavljala hiperbole.
12. Na hiperboli z enačbo $x^2 - y^2 = 4$ in goriščema F_1 ter F_2 določi take točke T , da bo trikotnik F_1F_2T pravokoten s pravim kotom pri T .
13. Napiši enačbo hiperbole, ki ima asimptoti $y = x + 4$ in $y = -x - 2$, če se eno gorišče hiperbole ujema z goriščem parabole $y^2 - 2y - 8x - 7 = 0$.
14. Izpelji enačbo parabole v središčni legi.
15. Izračunaj dolžino daljice, ki jo odreže parabola $y^2 = x$ od premice $y = x - 2$.
16. Določi enačbo parabole s temenom v koordinatnem izhodišču, če se njeno gorišče ujema z desnim goriščem elipse $x^2 + 5y^2 = 5$.
17. Napiši enačbo elipse, ki ima središče v temenu parabole $y^2 - 4y - 8x - 4 = 0$, eno gorišče se ujema z goriščem parabole in velja, da se elipsa dotika abscisne osi.

Poglavlje 5

Linearna in kvadratna funkcija, absolutna vrednost

1. Katera od danih tabel predstavlja linearno funkcijo?

x	y	x	y
0	1	2	1
1	-3	0	-3
2	-7	1	1

2. Določi predpis funkcije, ki obsegu kroga priredi njegov premer.
3. Določi smerna koeficiente premic, ki sta dani z enačbama $2x - 3y + 1 = 0$ in $4x - 5y + 6 = 0$ ter skiciraj njuna grafa (s pomočjo premikov).
4. Določi predpis funkcije, ki podatku o temperaturi v stopinjah Fahrenheit priredi vrednost v stopinjah Celzija, če vemo, da 32°F pomeni 0°C in 212°F pomeni 100°C . Kdaj temperaturi sovpadata?
5. Za en dan nameravamo najeti avto. Podjetje A zahteva 40 EUR in 0,15 EUR za vsak prevožen kilometr. Podjetje B pa računa 30 EUR in 0,20 EUR za vsak prevožen kilometr. Katera od obeh možnosti je, glede na število kilometrov, ki jih namrevamo prevoziti, ugodnejša?
6. Naj bo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ linearna funkcija. Dokaži, da za poljubna $a, b \in \mathbb{R}$ velja

$$f(2a - b) = 2f(a) - f(b).$$

7. Dana je družina funkcij $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, danih s predpisom

$$f_n(x) = (2 - n)x + 3 - n,$$

kjer je n naravno število. Dokaži, da imajo grafi vseh funkcij f_n skupno točko.

8. Ploščina trikotnika ABC je enaka 8, dve oglišči pa sta $A(3, 2)$ in $B(-2, 1)$. Tretje oglišče C leži na premici $y = 1 - \frac{x}{2}$. Določi koordinati točke C .

9. Dana je družina premic z enačbami:

$$y = ax - 3a + 2,$$

kjer je $a \in \mathbb{R}$. Določi vse točke v ravnini xy , ki ne leže na nobeni od teh premic.

10. Obravnavaj enačbo

$$\frac{mx}{n} + \frac{nx}{m} = \frac{m^2 - n^2}{mn} + 2x.$$

11. Obravnavaj enačbo

$$n(nx - 1) = k(kx + 1).$$

12. Obravnavaj neenačbo

$$ax + 2a > bx + 2b.$$

13. Obravnavaj neenačbo

$$a^2x - a^4 < x - 1.$$

14. Izpelji formulo za rešitve kvadratne enačbe.

15. S pomočjo premikov in raztegov skiciraj graf kvadratne funkcije, podane s predpisom $f(x) = 4x^2 + 10x + 2$.

16. Izpelji formuli za koordinati temena kvadratne funkcije.

17. Dan je polkrog s premerom $|AB| = 10$ cm. Naj bo točka T , ki leži na daljici AB , oddaljena x cm od točke A . Nad AT in TB konstruiramo polkroga. Naj bo $f(x)$ ploščina območja, ki ga omejujejo vsi trije polkrogi. Zapiši predpis za $f(x)$ in ugotovi, za kateri x je ploščina največja.

18. Kakšen pravokotnik ima pri danem obsegu o največjo ploščino?

19. Izpelji Vietovi formuli.
20. Ne da bi izračunal rešitvi x_1 in x_2 enačbe $x^2 + 2x - 9 = 0$, določi vrednost $x_1^2 + x_2^2$.
21. Opiši postopek reševanja kvadratne neenačbe in reši kvadratno neenačbo $x^2 - 2x - 3 < 0$.
22. Obravnavaj enačbi $x^2 + x + a = a^2$ in $m^2x^2 + 2mx = m^2 - 1$.
23. Leta 1974 je stric Pepi izjavil: *Če pomnožim svojo starost s starostjo pred 6 leti, dobim letnico svojega rojstva.* Kdaj je bil rojen stric Pepi?
24. Bazen polnita dva izvira: topli in mrzli. Oba skupaj ga napolnita v 6 urah. Mrzli izvir sam bi bazen napolnil 5 ur prej kot topli izvir sam. V kolikšnem času bi mrzli izvir sam napolnil bazen?
25. V mlin so pripeljali pošiljko pšenice. Mlinar ima 2 stroja. Prvi stroj sam bi za mletje potreboval 14 ur več kot drugi stroj sam. Potem ko je prvi stroj dve uri mlel sam, so vključili še drugega in po 19 urah in 35 minutah skupnega dela je bila vsa pšenica zmleta. Koliko časa bi za mletje potreboval prvi stroj sam?
26. Reši naslednje enačbe in neenačbe:
- (a) $\frac{x^2-1}{x-4} > 0$,
 - (b) $|x| = |x-1| + 1$,
 - (c) $|x^2 - 1| + 1 \leq |x+2|$,
 - (d) $|\frac{x^2-1}{x-7}| < 2$,
 - (e) $|1 - |x-1|| < 1$,
 - (f) $|2 + |x^2 - 4|| > 10$.
27. Skiciraj graf funkcije, ki je podana s predpisom $f(x) = \frac{1}{2}(|x| + x)$.
28. Nariši grafa funkcij, ki sta podani s predpisoma $f(x) = ||x-2| - 1|$ in $g(x) = |2x+2| - |2x-2|$.
29. Skiciraj grafa funkcij, ki sta podani s predpisoma $f(x) = 2x + |1 - x^2|$ in $g(x) = |1 - x^2| + |4 - x^2|$.

Poglavlje 6

Potenčne in korenske funkcije

1. Poenostavi naslednje izraze:

- (a) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}},$
- (b) $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} - 2\sqrt{4+\sqrt{14}} \cdot \sqrt{4-\sqrt{14}},$
- (c) $\sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{7-4\sqrt{3}},$
- (d) $\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}} + \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}},$
- (e) $2\sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}.$

2. Določi presečišča grafov funkcij $f(x) = \sqrt{20} - x^2$ in $g(x) = x^{-2}$. Nariši tudi ustrezno sliko!

3. Reši enačbe:

- (a) $(2x - 1)^{-3} = 8,$
- (b) $(x^2 - 5)^2 = 1,$
- (c) $(2x + 3)^{-4} = 81,$
- (d) $(x^3 - 1)^2 = 1.$

4. V pravokotnem koordinatnem sistemu imamo točko $T(a, 0)$, pri čemer je $a \neq 0$. Iz točke $A(0, 1)$ narišemo pravokotnico na daljico AT . Presečišče te pravokotnice z abscisno osjo je točka $U(z, 0)$. Izračunaj z ter nariši graf funkcije $z(a)$.

5. Poenostavi naslednje izraze:

- (a) $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$,
- (b) $\sqrt[3]{125x^4y^3} : \sqrt[6]{64x^8y^{12}}$,
- (c) $(0.75)^{0.25}(0.5)^{0.375}\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt[8]{18}$,
- (d) $(x^{\frac{9}{8}}y^{\frac{5}{4}})^{\frac{2}{3}}z^{\frac{5}{6}} : x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{3}{4}}z^{\frac{3}{4}}$,
- (e) $\sqrt[8]{x^4}\sqrt{x-2}\sqrt[4]{1-\frac{4}{x}+\frac{4}{x^2}}$,
- (f) $\left(\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt[4]{ab^3}-\sqrt[4]{a^3b}} + \frac{1+\sqrt{ab}}{\sqrt[4]{ab}}\right)^2 \sqrt{1+\frac{a}{b}-2\sqrt{\frac{a}{b}}}$.

6. Reši enačbo $\sqrt{x+1} + \sqrt{x} = (\sqrt{2} + 1)^2$.

7. Reši enačbo $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = (\sqrt{2} - 1)^4$.

8. Poenostavi izraz

$$\left(\sqrt{\frac{7+3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}} \sqrt{3-\sqrt{5}} \right)^{-2}$$

do oblike $\frac{a}{b}$, kjer sta $a, b \in \mathbb{N}$.

9. Obravnavaj enačbi:

- (a) $\sqrt{x-1} = a$
- (b) $\sqrt{x+2} = \sqrt{a-x}$

10. Ugotovi, za katere $a \in \mathbb{R}$ velja

$$\sqrt{a+\sqrt{a^2-1}} - \sqrt{a-\sqrt{a^2-1}} = \sqrt{2}\sqrt{a-1}.$$

11. Dana je funkcija s predpisom $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$.

- (a) Zapiši naravno definicijsko območje funkcije f .
- (b) Dokaži, da je f padajoča.
- (c) Določi največjo vrednost funkcije f .

12. Dana je funkcija s predpisom $f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$.

- (a) Zapiši naravno definicijsko območje funkcije f .
- (b) Dokaži, da je f naraščajoča.
- (c) Določi najmanjšo vrednost funkcije f .

- (d) Koliko rešitev ima enačba $f(x) = 3$?
13. Kolona vozil je dolga 6 km in pelje s stalno hitrostjo v . Policist na motorju se s hitrostjo $60 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ pelje od konca do začetka kolone, obrne in se z isto hitrostjo pelje do konca kolone. Za vse skupaj potrebuje $12,5$ minute. Koliko je v ?
14. Določi vsa realna števila a , za katera je enačba

$$x + \sqrt{x + \frac{1}{2}} + \sqrt{x + \frac{1}{4}} = a$$

rešljiva. Za take a poišči tudi rešitev.

Namig: Izraz pod korenom zapisi kot popolni kvadrat.

Poglavlje 7

Polinomi

1. Določi realna števila a, b, c, d in e tako, da bosta polinoma $p(x) = (b-1)x^5 + (c+2)x^4 + 2ex^3 - dx^2 - a + b$ in $q(x) = (a-b-c)x^5 + (b-2a)x^4 + 2dx^3 + 2c - 3$ enaka.
2. Dani so polinomi s predpisi $p_1(x) = x^{100} + x^{99} + x + 1$, $p_2(x) = x^{100} - x^{98} + x^{101} - 2$ in $p_3(x) = x^{100} - x^{55} - 2x$. Določi stopnje polinomov:
 - (a) $p_1^2 + p_3^2$,
 - (b) $(3p_1 - 2p_2)^2$,
 - (c) $(p_1 - p_3)^3$.
3. Dan je polinom $p(x) = x^5 - 3x^4 + 7x^3 - 3x^2 - 44x - 30$.
 - (a) Med polinomi $q(x) = ap(x)$, $a \in \mathbb{R}$, izberi tistega, ki ima v točki 1 vrednost 12.
 - (b) Izračunaj presečišče grafa polinoma $r(x) = -\frac{1}{6}p(x)$ in premice $y = 5x + 5$.
4. Polinom $p(x)$ deli s polinomom $q(x)$. Zapiši dobljeni kvocient $k(x)$ in ostanek $o(x)$. Pri tem velja:
 - (a) $p(x) = 22x^6 - 53x^4 - 17x^2 + 30$ in $q(x) = 2x^4 - 5x^2$,
 - (b) $p(x) = 5x^7 - 3x^4 + 2x^2 - 3$ in $q(x) = 2x^2 - x + 1$.
5. Pokaži, da sta pri deljenju polinomov kvocient in ostanek enolično določena.

6. Če polinom p deliš z $x - 2$ dobiš ostanek 3, če pa ga deliš z $x + 3$, dobiš ostanek -7 . Kolikšen je ostanek, če p deliš z $(x - 2)(x + 3)$?
7. Polinom p delimo s polinomom $q(x) = (x - a)(x - b)$, $a \neq b$, in dobimo ostanek $Ax + B$. Izrazi A in B .
8. Dan je polinom $p(x) = x^4 - 2x^2 + 1$.
- S katerim polinomom je potrebno deliti polinom p , da pri tem dobimo kvocient $x^2 - x + 1$ in ostanek $-3x + 3$.
 - Poisci vse razcepe polinoma p na produkt dveh polinomov druge stopnje z realnimi koeficienti z vodilnim koeficientom 1.
 - Zapiši polinom q , če je $q(x - 1) = p(x)$.
9. Če polinom $p(x) = -2x^5 + mx^4 - 8x^3 + mx^2 - 1$ deliš s polinomom druge stopnje $q(x)$, dobiš kvocient $k(x) = -x^3 + nx^2 - 2x + 1$ in ostanek $r(x) = nx - 2$. Izračunaj m in n ter omenjene polinome.
10. Pri katerih vrednostih realnega števila a je polinom $p(x) = x^4 + x^2 + a$ deljiv s polinomom $q(x) = x^2 + x + a$.
11. Pri katerih vrednostih parametra m je vsota dveh ničel polinoma $p(x) = x^4 - 8x^3 + mx^2 - 8x - 3$ enaka vsoti drugih dveh ničel?
12. Izračunaj b tako, da bo imel polinom $p(x) = x^3 - 12x + b$ ničlo druge stopnje in zapiši razcep na linearne faktorje.
13. Zapiši ničle, začetno vrednost in skiciraj približen graf polinoma:
- $p(x) = x^5 - 2x^4 - x^3 + 2x^2$,
 - $p(x) = 10x^4 + 2x^3 - 3x^2 + x - 4$,
 - $p(x) = x^4 - 4x^2 + 3$,
 - $p(x) = 3x^4 + 4x^3$,
 - $p(x) = x^5 + x^4 - x^3 - x^2 - 2x - 2$,
 - $p(x) = 4x^3 + 4x^2 + 3x + 1$.

Poglavlje 8

Racionalne funkcije

1. Določi ničle, pole, asimptote in načrtaj približne grafe funkcij:

- (a) $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$,
- (b) $f(x) = \frac{x^2+2}{x^2-1}$,
- (c) $f(x) = \frac{x^2+4x+3}{2x}$,
- (d) $f(x) = \frac{x^3-x^2}{x^2+1}$,
- (e) $f(x) = \frac{x^4-x^2+1}{x^2}$,
- (f) $f(x) = \frac{-x^4+x^2+2}{x-1}$.

2. Skiciraj grafa funkcij:

- (a) $f(x) = \frac{-|x|+1}{|x|-2}$,
- (b) $f(x) = \left| \frac{x^3-4x^2+4x}{x^2-1} \right|$.

3. Glede na parameter $a \in \mathbb{R}$ obravnavaj rešljivost enačbe

$$\frac{2a-3}{x+a} - 1 = \frac{2-x}{x-1}.$$

4. Glede na parameter m obravnavaj in reši enačbo

$$\frac{m-x^2}{(m-x)^2} = \frac{1}{m} + \frac{m-1}{m^3 - mx(2m-x)}.$$

5. Pri katerih vrednostih spremenljivke x graf funkcije $f(x) = \frac{2x^3+x^2-3x-14}{x^3-8}$ leži nad premico z enačbo $y = 2$?

6. Reši neenačbo

$$\frac{x}{x-1} < \frac{x^2 + 4x + 2}{x^3 - 1}.$$

7. Reši neenačbo

$$\frac{-2x}{x+2} - \frac{3}{2-x} - \frac{1-x}{x} \geq \frac{-2x^3 - 9x - 2}{x^3 - 4x}.$$

8. Obravnavaj in reši enačbo

$$\frac{1}{2a+ax} - \frac{1}{2x-x^2} = \frac{2a+6}{x^3-4x}.$$

9. Določi vrednosti parametra $a \in \mathbb{R}$ tako, da bo za vsak $x \in \mathbb{R}$ veljalo

$$-3 < \frac{x^2 + ax - 2}{x^2 - x + 1} < 2.$$

10. Določi parameter $a \in \mathbb{R}$, da bo za vse $x \in \mathbb{R}$ izpolnjena neenakost

$$\left| \frac{x^2 + (a+1)x + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3.$$

11. Funkcija f je podana s predpisom

$$f(x) = \left| \frac{x+6}{3-2x} \right|.$$

- (a) Zapiši f brez znakov za absolutno vrednost in skiciraj njen graf.
- (b) Reši neenačbo $f(x) < |3x - 2|$.

12. Na parcialne ulomke razcepi izraz:

(a) $\frac{3x+2}{(x+1)^2(x-1)}$,

(b) $\frac{1}{x^3-1}$.

Poglavlje 9

Limita in zveznost funkcije

1. Po definiciji dokaži, da je $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.
2. Izračunaj $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2 - 1}$ in resničnost odgovora dokaži s pomočjo definicije.
3. S pomočjo definicije dokaži, da je

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2} = \infty.$$

4. Izračunaj $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x+1}$ in resničnost odgovora dokaži s pomočjo definicije.
5. Izračunaj naslednje limite:

$$(a) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 + 1},$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x - a}, m \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+3x} - 1},$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x},$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{ax} - x}{x - a}, a \in \mathbb{R}^+,$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|},$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(3x)},$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x-1},$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}}.$$

6. Izračunaj limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} \right) \text{ in } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}.$$

7. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ naj bo podana s predpisom

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax}{|x|}, & x < 0 \\ 2x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Določi a tako, da bo f zvezna na celotnem definicijskem območju.

8. Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ naj bo podana s predpisom

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a-x}{x-1}, & x < -1 \\ bx - 2, & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{x-1}{\sqrt{x-1}}, & x > 1. \end{cases}$$

Določi števili a in b tako, da bo f zvezna na celotnem definicijskem območju.

Poglavlje 10

Odvod

1. Po definiciji izračunaj odvod funkcije $f(x) = \sqrt{x}$.
2. Izračunaj odvode funkcij:
 - (a) $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$,
 - (b) $f(x) = (2x^{\frac{3}{2}} + \sqrt[4]{4x+1})^n$, $n \in \mathbb{N}$,
 - (c) $f(x) = \ln(\cos x) \sin(2x)$,
 - (d) $f(x) = x^x$,
 - (e) $f(x) = \frac{\arctan x}{\arcsin(x^2)}$.
3. Dana je funkcija s predpisom $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 1$. Zapiši enačbe vseh tangent na graf funkcije f , ki so vzporedne premici z enačbo $2x + y - 1 = 0$.
4. Podani sta funkciji f in g s predpisoma $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ in $g(x) = ax^2$. Pri katerih vrednostih realnega števila a bo tangenta na graf funkcije f v točki $x = 1$ hkrati tudi tangenta na graf funkcije g ?
5. Dana je družina funkcij $f_a(x) = ax^2 + (a-3)x + 2a$, kjer je $a \in \mathbb{R}$. Določi parameter a tako, da bo premica $y = -3x + 5$ tangenta na graf funkcije f_a . Izračunaj tudi dotikališče.
6. Podana je funkcija s predpisom $f(x) = 2 \arcsin(\sqrt{1-2x})$. Poiči vsa realna števila x , za katera velja, da je tangenta na f v točki z absciso x vzporedna premici $y + 8x = 5$.

7. Za funkcijo $f(x) = x^3 - 3x^2$ določi intervale naraščanja in padanja ter klasificiraj lokalne ekstreme. Določi tudi območja konveksnosti in konkavnosti!
8. Dokaži, da za vsak $x \in \mathbb{R}^+$ velja $\ln(x+1) < x$.
9. Dokaži, da za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja $1+x \leq e^x$.
10. Izmed vseh pravokotnikov, ki jih lahko včrtamo v krog s polmerom r , poišči tistega z največjo ploščino.
11. Iz 9 m žice naredimo model pravilne tristrane prizme z osnovnim robom a in višino v . Izračunajte dolžino osnovnega roba tako, da bo prostornina prizme največja.
12. S pomočjo odvoda skiciraj graf funkcije, podane s predpisom:
- $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x-2}$,
 - $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$,
 - $f(x) = (2x^2 - 17)(x^2 - 1)^{\frac{2}{3}}$.

Poglavlje 11

Kotne in krožne funkcije

1. Dokaži, da je $(\sin x)' = \cos x$.
2. Dana je funkcija s predpisom $f(x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$.
 - (a) Za katere vrednosti spremenljivke x na intervalu $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ velja neenakost $f(x) < 0$.
 - (b) Pokaži, da je funkcija f periodična in skiciraj njen graf.
3. Poišči osnovno periodo funkcije $f(x) = 2 \sin(3x) - 1$.
4. Dana je funkcija s predpisom $f(x) = \cos x - \sin x$.
 - (a) Zapis predpisa funkcije f preoblikuj tako, da bo v njem le funkcija sinus.
 - (b) Zapiši ničle funkcije f in točke, v katerih funkcija f doseže najmanjšo oziroma največjo vrednost ter nariši njen graf na intervalu $[-2\pi, 2\pi]$.
5. Ali je funkcija f , podana s predpisom $f(x) = |\tan(x - \frac{\pi}{2})|$, periodična? Če je, kakšna je njena osnovna perioda?
6. Dan je izraz $A = \cos^2 x - \sin^2 x + \sin(2x)$.
 - (a) Pretvori izraz A v produkt.
 - (b) Za katere vrednosti parametra m ima enačba $A = m$ realne rešitve?
 - (c) Reši enačbo $A = \sqrt{2}$.
7. Reši enačbe:

- (a) $3 \cos^2 x - \sin x \cos x = 2,$
- (b) $\cos x = 3 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2},$
- (c) $\sin^2 x = 2(\sin x \cos x + 1),$
- (d) $\sin x + 2 \cos x = 1,$
- (e) $\cos x + \cos(7x) + \cos(4x) = 0,$
- (f) $3 \sin x - \sin^2 x = \cos(2x) + 3,$
- (g) $\sin^2 \frac{x}{2} - \cos x - \frac{1}{2} \sin x = 0,$
- (h) $\frac{1}{2} \cos x - \sin^2 x \cos x = 0,$
- (i) $2 \cos^2 x + \sin(2x) = 2,$
- (j) $\sin(2x) - \cos(\frac{x}{2}) = 0.$

8. Reši neenačbi:

- (a) $2 \cos(x - \frac{\pi}{4}) < 0,$
- (b) $\frac{5}{4} \sin^2 x + \frac{1}{4} \sin^2(2x) > \cos(2x).$

9. Izrazi funkcijo $\arctan x$ s funkcijo \arcsin .

10. Naj bo $f(x) = \cos(\arcsin x)$. Izrazi funkcijo f brez krožnih in trigonometričnih funkcij.

11. Skiciraj grafa funkcij:

- (a) $f(x) = \sin(\arcsin x),$
- (b) $g(x) = \arcsin(\sin x).$

12. Nariši grafa funkcij:

- (a) $f(x) = \tan(\arctan(x)),$
- (b) $g(x) = \arctan(\tan(x)).$

13. Reši enačbo

$$\arcsin x + \arccos(2x) = \frac{\pi}{6}.$$

Priloga k poglavju 11: Osnovne formule

Navedene formule veljajo za vsa realna števila x, y , kjer so ustreznne funkcije definirane.

1. Osnovne zveze:

$$(i) \cos^2 x + \sin^2 x = 1,$$

$$(ii) \tan x = \frac{1}{\cot x},$$

$$(iii) 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x},$$

$$(iv) 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

2. Formule za komplementarne kote:

$$(i) \sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x, \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x,$$

$$(ii) \tan(\frac{\pi}{2} - x) = \cot x, \cot(\frac{\pi}{2} - x) = \tan x.$$

3. Adicijski izreki:

$$(i) \sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y,$$

$$(ii) \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y,$$

$$(iii) \tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \cdot \tan y}.$$

4. Formule za računanje dvojnih kotov:

$$(i) \sin(2x) = 2 \sin x \cos y, \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

$$(ii) \tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

5. Formule za računanje polovičnih kotov:

$$(i) \sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}},$$

$$(ii) \cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}},$$

$$(iii) \tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}.$$

6. Formule za pretvarjanje produkta v vsoto:

$$(i) \sin x \cdot \sin y = -\frac{1}{2}(\cos(x + y) - \cos(x - y)),$$

$$(ii) \sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x + y) + \sin(x - y)),$$

$$(iii) \cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x + y) + \cos(x - y)).$$

7. Formule za pretvarjanje vsote v produkt:

- (i) $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$,
- (ii) $\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$,
- (iii) $\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$,
- (iv) $\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$.

Poglavlje 12

Eksponentna in logaritemska funkcija

1. Dana je funkcija f s predpisom $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{3-x} + 1$.
 - (a) Izračunaj presečišča grafa funkcije f z obema koordinatnima osema. Nato dokaži, da je funkcija pozitivna, zapiši enačbo vodoravne asimptote in nariši njen graf.
 - (b) Nariši graf funkcije $g : x \mapsto f(|x|)$ in določi zaloge vrednosti te funkcije.
2. Reši neenačbo $3^{x-1} > 5^{x-1}$ in skiciraj graf funkcije $f(x) = 3^{x-1} - 3^{x-2} - 4 \cdot 3^{x-3}$.
3. Graf funkcije $f(x) = ae^{bx}$ poteka skozi točki $A(2, 10)$ in $B(8, 80)$. Izračunaj a in b .
4. Reši enačbi:
 - (a) $2^{3x+1} + 2^{2x+1} = 6 \cdot 2^{x+1}$,
 - (b) $2^{3-2x} - 9 \cdot 2^{1-x} + 4 = 0$.
5. Reši neenačbe:
 - (a) $2^{x^2-5x+10} < 16$,
 - (b) $2^{x^2} > \frac{1}{4}(2^x)^3$,
 - (c) $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^2$.
6. Reši sistem:

- (a) $3^{2x} - 2^y = 65$, $3^x + 2^{\frac{y}{2}} = 13$,
- (b) $x^2y = y^x$, $x^3 = y^2$.
7. Dokaži formulo za prehod na novo osnovo logaritma.
8. Določi definicijsko območje funkcije $\sqrt{\log(1-x-x^2)}$.
9. Izračunaj in poenostavi:
- (a) $\log_{a+b}(10a^3 + 30a^2b + 30ab^2 + 10b^3)$,
- (b) $3\log_8 96 - \frac{1}{\log_3 2}$.
10. Naj bodo $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, tako da velja tudi $c + b, c - b, a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Dokaži, da je trikotnik s stranicami a, b, c , ki zadoščajo enakosti $\log_{c+b} a + \log_{c-b} a = 2\log_{c+b} a \cdot \log_{c-b} a$, pravokoten.
11. Reši enačbe:
- (a) $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 1 + \frac{1}{3}\log_2 \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$,
- (b) $8x = x^{\log_8 x^{12}}$,
- (c) $\log(x+3) + \log(x+1) = \frac{1}{\log_2 10}$,
- (d) $1 + \log(1+x^2 - 2x) = \log(1+x^2) + 2\log(1-x)$,
- (e) $(\log x)^x = 1$.
12. Graf funkcije $f(x) = -2\log_5 x + 2$ vzporedno premakni tako tako, da se bo točka $T(1, 2)$ preslikala v točko $P(-1, 1)$. Zapiši enačbo dobljene funkcije in nariši njen graf.
13. Določi konstanto n , da bo točka $A(3, y)$ presečišče grafov $y = -\frac{1}{3}x + n$ in $y = \log_2(x+1) - 1$. Za obe funkciji poišci tudi inverzni funkciji.
14. Nariši grafa funkcij $f(x) = \ln(x)$ in $g(x) = 2 + \ln(x+3)$. Določi vzporednico osi y , tako da bo sekala grafa v točkah, medsebojno oddaljenih za 3 enote.
15. Ugotovi, ali je f soda oziroma liha:
- (a) $f(x) = \frac{x}{a^x - 1}$
- (b) $f(x) = \log(x + \sqrt{1+x^2})$
- (c) $f(x) = x \frac{a^x - 1}{a^x + 1}$
16. S pomočjo odvoda skiciraj graf funkcije $f(x) = \ln(\cos x)$.